

## QUAND ET COMMENT PRENDRE LE MÉDICAMENT

30 minutes avant le petit déjeuner pour faciliter l'absorption. Prendre le médicament à la même heure chaque jour prescrit par votre médecin.

Se placer dans une pièce au calme et se laver les mains à l'eau et au savon.

Sur une surface nettoyée, à distance de tout autre médicament, nourriture, objet, poser un champ côté absorbant vers le haut (faire couler une goutte d'eau dessus pour vérifier que la goutte est absorbée). Enfiler une paire de gants neuve à usage unique.



Agiter le flacon avant emploi.

Prélever le volume de solution nécessaire avec la pipette ou seringue à usage oral dédiée et le mettre dans un grand verre de jus d'orange pour sa prise (ou jus de pomme, de sirop à la menthe ou de grenadine). Bien mélanger avec une cuillère avant la prise.

Après la prise du médicament, en gardant les gants, nettoyer la surface avec un sopalin, jeter tout papier en contact avec la solution et les gants dans la boîte à déchets jaune qui vous a été remise. Laver consciencieusement et abondamment le verre et la cuillère à l'eau courante. Enfin, enlever les gants et les jeter dans le bac déchet.

Se laver les mains à l'eau et au savon.

Noter dans le carnet de suivi la date et l'heure de la prise, ainsi que les éventuels problèmes rencontrés

Effets secondaires	Prévention	Conduite à tenir
<b>Infection</b> (diminution du nombre de cellules qui combattent l'infection dans le corps: globules blancs)	Éviter tout contact avec les personnes qui ont des affections contagieuses et signaler à votre médecin tout signe précurseur d'une infection, comme une fièvre, ou des frissons	Prenez la température chaque jour. Contacter le médecin en cas de signes infectieux (fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires). Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits
<b>Nausées et vomissements</b>	Une bonne hydratation est nécessaire. Évitez les aliments frits, gras ou épicés. Faire 4-5 petits repas légers par jour	En cas de vomissements, rincez la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. Un traitement pour éviter les nausées et vomissements est souvent associé
<b>Plaies douloureuses dans la bouche</b>	Évitez les aliments acides, épicés et irritants. Une bonne hygiène buccale est conseillée	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez le médecin prescripteur. Pas de bain de bouche sans avis médical
<b>Troubles urinaires</b> : sang dans les urines ou difficultés pour uriner	Bien s'hydrater avec une eau alcaline A( A A	A

## QUE FAIRE EN CAS DE ...



**Oubli** : ne pas doubler la dose. Prendre la dose suivante à l'heure habituelle et noter l'oubli dans le carnet de suivi.



**Lessive** : Laver à part, le linge qui a été en contact direct avec la peau ou souillé.



**Bris de flacon** : Mettre des gants à usage unique, essuyer avec un papier absorbant, en ramenant les bris et le liquide du pourtour vers le centre, mettre les débris dans la boîte à déchets qui vous a été remise, rincer plusieurs fois la surface à l'eau du robinet et jeter les gants dans la même boîte. Se laver les mains.