

## QUAND ET COMMENT PRENDRE LE MÉDICAMENT

30 à 60 minutes avant un repas (à jeun pour faciliter son absorption)

Se placer dans une pièce au calme et se laver les mains à l'eau et au savon  
Sur une surface nettoyée, à distance de tout autre médicament, nourriture, objet, poser un champ côté absorbant vers le haut (faire couler une goutte d'eau dessus pour vérifier que la goutte est absorbée). Enfiler une paire de gants neuve à usage unique.



Agiter le flacon avant emploi.

Ne pas écraser les comprimés éventuellement associés. Manipuler les comprimés sécables avec des gants.

Prélever le volume de suspension nécessaire avec la pipette ou seringue à usage oral dédiée et le mettre dans un grand verre d'eau pour sa prise.

Après la manipulation, en gardant les gants, nettoyer la surface avec un sopalin, jeter tout papier en contact avec la suspension et les gants dans le container jaune qui vous a été remis. Bien laver le verre et la cuillère à l'eau courante. Enfin, enlever les gants et les jeter dans le bac à déchets.

Se laver les mains à l'eau et au savon.

# QUELQUES CONSEILS POUR MIEUX VIVRE LE TRAITEMENT



Ce médicament peut réagir avec d'autres **traitements** : Ne prenez pas d'autres médicaments sans avis de votre médecin.

## GESTION DES EFFETS SECONDAIRES

Effets secondaires	Prévention	Conduite à tenir
<b>Infection</b> (diminution du nombre de cellules qui combattent l'infection dans le corps : globules blancs)	Éviter tout contact avec les personnes qui ont des affections contagieuses et signaler à votre médecin tout signe pré-curseur d'une infection, comme une fièvre, ou des frissons	Prenez la température chaque jour. Contacter le médecin en cas de signes infectieux (fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires). Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits
<b>Diminution des plaquettes</b> (saignement)	Utilisez une brosse à dent souple. Évitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ...	En cas de saignement important, selles noires, saignements de nez et crachats comportant du sang, contacter rapidement votre médecin
<b>Nausées et vomissements</b>	Une bonne hydratation est nécessaire. Évitez les aliments frits, gras ou épicés. Faire 4-5 petits repas légers par jour	En cas de vomissements, rincez la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. Un traitement pour éviter les nausées et vomissements est souvent associé
<b>Fatigue</b>	Avoir une bonne hygiène de vie, savoir se reposer, garder une activité physique adaptée régulière	
<b>Coup de soleil</b>	Éviter l'exposition solaire, utiliser une crème solaire et un baume pour les lèvres avec indice de protection maximale	Contacter rapidement le médecin éruption cutanée et urticaire

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament. Signaler tout autre effet indésirable à votre médecin ou pharmacien.

## QUE FAIRE EN CAS DE ...



**Oubli** : ne pas doubler la dose. Prendre la dose suivante à l'heure habituelle et noter l'oubli dans le carnet de suivi.



**Lessive** : Laver à part, le linge qui a été en contact direct avec la peau ou souillé.



**Bris de flacon** : Mettre des gants à usage unique, essuyer avec un papier absorbant, de l'extérieur vers l'intérieur, mettre les débris dans le container qui vous a été remis, rincer plusieurs fois la surface à l'eau du robinet. Jeter les gants et se laver les mains.

## PLAN DE PRISE

	Lever (a jeun)	Ma n Pe t- déjeuner	Colla on	Midi Déjeuner	Goûter	Soir - Diner	Infusion	Coucher
heure des prises								
"o# des #édica- #ents et Conseils !ar culiers								

*Il est important de bien respecter toutes ces indications.  
Vos professionnels de santé sont à votre service pour tout autre renseignement.*